

Kantbæger

Nicandra physalodes

Kantbæger tilhører natskyggefamilien og er som så mange i denne familie lettere giftig.

Den er etårig og vokser helst på dyrket jord i fuldt lys. Den er sydamerikaner af oprindelse og vokser vildt i Peru.

Som sydlænding tøver den med at spire i det kolde danske forår. Den venter hellere til jorden er varm nok til bønner, men så har den til gengæld også fart på og på kort tid kan den nå at blive en hel busk at se på med mange forgreninger på stænglen.

Alle grene blomstrer med store violette blomster, der sidder enkeltvis, og udvikler hylstre om bærret ligesom det kendes hos 'jødekirsebær' og 'kinesiske lygter.' Hylstret er først en fin lille lysegrøn 'lygte', der senere får mørkviolette skygger.

Med sin sene start, er kantbæger blandt de sommerblomster, der gør sig bemærket længst tid i havens højsæson. Den når sin fulde volumen i september.



Kantbæger siges at have været brugt i kampen mod fluer, hvor plantens rod og blade, blandes op med mælk, og fluerne dør, når de smager på det. Mælken anbringes selvfølgelig et sted, hvor ingen kommer til at drikke af det.

(Der garanteres ikke for rigtigheden af denne påstand, men hvis det passer, er metoden langt mere uskyldig, end brug af insektgifte.)

Kantbæger sår sig selv, hvilket har gjort den upopulær i intensivt landbrug i Brasilien og USA, hvor den modstår sprøjtemidler og kemisk krigsførelse. Den er imidlertid let at luge væk, så der er ingen grund til at frygte, at den overtager hele haven.

Middelalderhaven fakta:

Kantbæger kom fra Peru til Europa og så videre til Danmark, som prydblade. Den vokser i Stege på et fortov. Ellers i haver og på jord, som ikke dyrkes.

Tema 1: Indført plante