

Kermesbær

Phytolacca acinosa

Kermesbær, er en staude, de hvert år skyder tykke stængler op fra en roeagtig rodknold.

Bladene er op til 20 cm lange og afrundede.

Stænglen er tyk og saftig bærer i toppen en blomsterstand med lyslilla blomster, der efter bestøvning udvikler tætsiddende klynger af sorte bær, der kan minde om flade brombær.

Den blomstrer fra juli til tidlig oktober.

Kermesbær formerer sig let og trives både i halvskygge og i fuld sol. Den enkelte plante bliver ikke særlig gammel, så hvis man vil have den i sin have, må man give plads til, at nye individer kan etablere sig.

Kermesbær har tidligere været anvendt medicinsk og som farve i vin og konfekt, men bruges ikke mere, fordi den er lettere giftig for mennesker og andre pattedyr.

Fugle derimod lider ingen skade og planten spreder sig ofte ved fuglenes hjælp.

I dag bruges planten i prydhaver, pga. sit flotte udseende. Undertiden forvilder den sig uden for hækken og kan findes vildvoksende tæt ved bebyggelser. Den er i øjeblikket under udbredelse i det meste af landet, og træffes i den vilde natur. I Stege er den udbredt og i Middelalderhaven dukker den op.

Det er Asiatisk Kermesbær.